

# FÍSICA

2º CURSO



## BLOQUE 4: FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS 10. PRINCIPIOS DE RELATIVIDAD



Sistemas de referencia inercial y no inercial. La Relatividad en la Mecánica Clásica. Limitaciones de la Física clásica. Experimento de Michelson-Morley. Principios fundamentales de la Relatividad especial y sus consecuencias: contracción de la longitud, dilatación del tiempo, energía y masa relativistas. Postulados de Einstein.



**1. El conflicto entre la electrodinámica y Newton.**

**2. Antecedentes de la relatividad especial**

2.1. La relatividad de Galileo y Newton

2.2. La relatividad galileana y el problema de la luz

2.3. Experimento de Michelson y Morley

2.4. Proposición de Lorentz y Fitzgerald

**3. Postulados de la teoría de la relatividad especial**

3.1. La relatividad del tiempo y el concepto de simultaneidad

**4. Consecuencias de los postulados de Einstein**

4.1. Dilatación del tiempo

4.2. Contracción de la longitud

4.3. La paradoja de los gemelos

**5. Transformaciones de Lorentz**

5.1. Transformación de Lorentz de la velocidad

5.2. La velocidad de la luz: una constante en cualquier sistema y un límite infranqueable

**6. Principios de la dinámica a la luz de la relatividad**

6.1. Masa y momento relativistas

6.2. Masa y energía relativistas

**7. Evidencias experimentales**



☞ Consecuencias de la **teoría electrodinámica de Maxwell**:

- La luz se propaga en el vacío a 300 000 km/s.
- Maxwell consideraba que las OEM se desplazaban por el **éter lumífero** que inundaba el espacio y envolvía a los cuerpos.
- El **éter** debía tener unas propiedades asombrosas: una **gran rigidez y elasticidad** (que permitiera la propagación de ondas transversales) y una **densidad despreciable** (que permitiera que la luz se propagase a una velocidad tan elevada).

☞ Surgieron preguntas, entre ellas:


- *¿Tendría la velocidad de la luz el mismo valor si se midiera en dos sistemas inerciales distintos, independientemente de que uno se moviera con una velocidad determinada con respecto al otro?*



- ☞ Si la velocidad de la luz tuviese el mismo valor, no sería aplicable, a la electrodinámica, el principio de relatividad galileano (composición de velocidades), que estaba probada su validez en la leyes de la mecánica.
- ☞ Si no era así debería existir un **sistema de referencia privilegiado**, en reposo con respecto al hipotético éter, en el que la luz se propaga con la velocidad calculada por Maxwell (sistema de referencia absoluto).
- ☞ Si la velocidad de la luz dependiera del movimiento relativo del observador añadía complicaciones, la formulación de Maxwell no contemplaba esos supuestos.
- ☞ En 1879, Maxwell sugirió un posible método para medir la velocidad de la Tierra respecto al éter, que permitiría establecer el sistema de referencia absoluto. **Albert A. Michelson** llevó a cabo el experimento con un resultado negativo.
- ☞ En 1905, **Albert Einstein**, publica varios trabajos, entre ellos, uno denominado: “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”.



### 2.1. La relatividad de Galileo y Newton



☞ **Galileo** y **Newton** ya se plantearon el problema de cómo serían interpretados los movimientos de los cuerpos y las leyes físicas desde el punto de vista de dos observadores que se encontrasen en MRU.

☞ Galileo concebía el movimiento parabólico como la composición de dos movimientos independientes.

☞ Llegaron a la siguiente conclusión:


Las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

Un **sistema de referencia inercial** es aquél que se encuentra en reposo relativo o en movimiento rectilíneo uniforme.



### 2.1. La relatividad de Galileo y Newton

#### ► Transformación galileana de la posición y la distancia




$$\vec{r} = \overline{OO'} + \vec{r}' \quad \longrightarrow \quad \vec{r}' = \vec{r} - \overline{OO'} = \vec{r} - \vec{v}t \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \quad \text{transformaciones galileanas de las coordenadas}$$



## 2.1. La relatividad de Galileo y Newton

### ► Transformación galileana de la posición y la distancia



Observador  $O$ :  $d = x_{P'} - x_P$

Observador  $O'$ :  $d' = x'_{P'} - x'_P = (x_{P'} - vt) - (x_P - vt)$  }  $\rightarrow d = d'$

La distancia entre dos puntos es invariable para cualquier sistema inercial



## 2.1. La relatividad de Galileo y Newton

### ► Transformación galileana de la velocidad

☞ Derivando las ecuaciones de la posición de Galileo:

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} v'_{x'} = v_x - v \\ v'_{y'} = v_y \\ v'_{z'} = v_z \\ t' = t \end{cases}$$

☞ Donde  $\vec{v}'(v'_{x'}, v'_{y'}, v'_{z'})$  representa la velocidad medida por el observador O', mientras que  $\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$  es la velocidad medida por el observador O.

La velocidad es variable al pasar de un sistema de referencia inercial a otro.



## 2.1. La relatividad de Galileo y Newton

### ► Transformación galileana de la aceleración

☞ Si admitimos que la velocidad relativa entre los dos sistemas es constante:

$$\left\{ \begin{array}{l} v'_{x'} = v_x - v \\ v'_{y'} = v_y \\ v'_{z'} = v_z \\ t' = t \end{array} \right. \quad \longrightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} a'_{x'} = a_x \\ a'_{y'} = a_y \\ a'_{z'} = a_z \\ t' = t \end{array} \right.$$

La aceleración es invariable en los sistema de referencia inerciales.

☞ Es decir  $\vec{a}' = \vec{a}$ , en consecuencia ambos observadores harían referencia a la misma fuerza para explicar la aceleración, lo que da pie al enunciado del **principio de relatividad galileano**:

Las leyes básicas de la naturaleza son las mismas para observadores que se encuentran en sistemas de referencia inerciales.

☞ Esta identidad dio pie a la premisa de que:

Es imposible conocer si un sistema de referencia está en reposo absoluto o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme.



## ACTIVIDADES

1. Una trainera emplea 10 minutos en recorrer 4 km cuando navega a favor de la corriente. Esos mismos 4 km los recorre en 24 minutos al navegar a contracorriente. ¿Cuál es la velocidad de la trainera y la de la corriente con respecto a un observador que se halla en reposo en la orilla?

**Sol:**  $v_{trainera} = 17 \text{ km h}^{-1}$ ;  $v_{corriente} = 7 \text{ km h}^{-1}$

2. La posición de una partícula según el sistema O es  $\vec{r} = (4t^2 - 2t)\hat{i} - t^3\hat{j} + 2\hat{k}$  m, mientras que con respecto a O' es  $\vec{r}' = (4t^2 + 3t)\hat{i} - t^3\hat{j} - 4\hat{k}$  m.
  - a) ¿Cuál es la velocidad relativa entre ambos sistemas?
  - b) ¿Se cumplen las leyes físicas por igual en ambos sistemas? Demuéstralo.

**Sol:** a)  $\vec{v}_{O'O} = 5\hat{i} \text{ m s}^{-1}$ ; b) Sí.



## 2.2. La relatividad galileana y el problema de la luz


- ➡ Para Maxwell, la velocidad máxima a la que pueden propagarse las ondas electromagnéticas viene dada por:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- ➡ ¿Sería la misma la velocidad de propagación de la luz medida por un observador en movimiento con velocidad  $v$  que por otro que estuviera en reposo? De ser así, se violaría el principio de relatividad galileano, que indica que la velocidad es variable al pasar de un sistema a otro.
- ➡ Si las velocidades medidas por ambos observadores fueran distintas, se pondría en entredicho la validez de las ecuaciones de Maxwell, que solo sería válidas para un determinado sistema de referencia privilegiado.
- ➡ A finales del siglo XIX, esta era la situación.
- ➡ La constancia o la variación de la velocidad de la luz al pasar de unos sistemas a otros encerraba la clave.



### 2.3. Experimento de Michelson y Morley



**Los haces se movían siempre con una velocidad constante, independientemente de su orientación.**

👉 Conclusiones:

- No existe movimiento relativo entre la Tierra y el éter.
- Las transformaciones de galileo no se cumplen en el caso de la luz.
- La velocidad de la luz es siempre constante, independientemente del movimiento del foco emisor.



## 2.4. Proposición de Lorentz y Fitzgerald

- ➔ **Lorentz y Fitzgerald** propusieron una misma hipótesis, “hipótesis de la *contracción de la longitud*” de los cuerpos en movimiento a través del éter.
- ➔ Según sus cálculos, la longitud de un cuerpo se reducirá en la dirección del movimiento en un factor:

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

- ➔ Esta contracción aplicada al brazo del interferómetro de Michelson orientado en la dirección del movimiento terrestre, explicaba la ausencia de resultados.
- ➔ En 1904, **Poincaré** apuntaba que: “quizás debemos construir toda una nueva mecánica que hasta ahora solo hemos logrado entrever y en la que, al aumentar la inercia con la velocidad, la velocidad de la luz se convertiría en un límite infranqueable”.



☞ Einstein abordó el problema desde un punto de vista revolucionario:

- Dado que todos los intentos de encontrar un sistema de referencia privilegiado han fracasado, se considera, por tanto, que no existe, por lo que:

Son sistemas inerciales aquellos que se mueven unos con respecto a otros con velocidad relativa constante.

- Puesto que la velocidad de la luz no parece sufrir modificaciones, se asumirá que es constante.

☞ La teoría de Einstein se estructura, pues, a partir de estos dos postulados:



**Primer postulado.** Todas las leyes físicas se cumplen por igual en todos los sistemas de referencia inerciales.

**Segundo postulado.** La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales y es, además, independiente del movimiento de la fuente emisora y del observador.





### 3.1. La relatividad del tiempo y el concepto de simultaneidad




- ☞ Dos sucesos que ocurren simultáneamente para un observador, pueden no ser simultáneos para otro.
- ☞ El tiempo es relativo, y el intervalo de tiempo entre dos sucesos depende del sistema de referencia, de modo que:
  - Será igual para dos observadores estacionarios uno con respecto al otro si los sucesos ocurren en el mismo punto.
  - Será distinto para dos observadores en movimiento relativo uno con respecto al otro.

La relatividad del tiempo es consecuencia de la velocidad límite de la luz



## 4.1. Dilatación del tiempo



☞ **Medición del tiempo según O':**

Si  $D$  es la distancia entre los espejos de la nave, y  $c$ , la velocidad de la luz, el tiempo que tarda la luz en la ida y la vuelta:


$$\Delta t' = \frac{2D}{c}$$



### 4.1. Dilatación del tiempo

#### 👉 Medición del tiempo según O:

El observador O ve que la nave se ha desplazado una distancia  $d = v\Delta t$  en el tiempo que tarda el destello en volver reflejado al suelo, recorriendo una distancia total de  $c\Delta t$ .



$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 + D^2 \quad \Rightarrow \quad c^2\Delta t^2 = v^2\Delta t^2 + 2^2D^2$$

Reorganizando:

$$\Delta t = \frac{2D}{c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{como,} \quad \Delta t' = \frac{2D}{c} \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \gamma\Delta t'$$

El tiempo transcurre más lentamente para O' que para O.



## ACTIVIDADES

3. Los astronautas de una nave interestelar que se desplaza a una velocidad de  $0,8 \cdot c$  llevan, según sus relojes que se hallan a bordo de la nave, 30 días exactos de viaje. ¿Cuánto tiempo han estado viajando según el centro de control de Tierra?


**Sol:**  $t = 50$  días

4. Un viaje interestelar a un sistema planetario extrasolar ha durado, según los relojes de a bordo de la nave, 4 años, a una velocidad constante de  $0,9 \cdot c$ . ¿Cuánto tiempo ha durado el viaje según el centro de control de Tierra?

**Sol:**  $t = 9,176$  años



## 4.2. Contracción de la longitud



- ➡ Para el observador O, la longitud que recorre la nave viene dada por:

$$l = x_2 - x_1 = v\Delta t$$

- ➡ Para O', dado que  $\Delta t' = \Delta t/\gamma$ , medirá una longitud:

$$l' = v\Delta t' = \frac{l}{\gamma} = l \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Expresión conocida como la fórmula de la **contracción de la longitud**.



## ACTIVIDADES

5. Una vara de 1 m de longitud se mueve con respecto a nuestro sistema de referencia con una velocidad  $0,7 \cdot c$ . ¿Cuál sería la longitud que mediríamos? ¿A qué velocidad debería moverse la vara para que su longitud fuera de 50 cm para nosotros?

**Sol:**  $L = 0,714 \text{ m}; v = 0,866 \text{ c}$



## 4.3. La paradoja de los gemelos

Pólux está a 35 años luz de distancia de la tierra

Rodrigo y Andrés son dos hermanos gemelos. Rodrigo hará un viaje espacial a Pólux en una nave que viaja casi a la velocidad de la luz.

Año 3000

Año 3000



## ACTIVIDADES

6. Los astronautas de una nave interestelar que viaja al 99 % de la velocidad de la luz deciden emplear una hora de su tiempo para la comida. ¿Cuánto dura esta para el centro de control de Tierra?



**Sol:**  $t = 7,09 \text{ horas}$

7. ¿Qué contracción de longitud experimentaría el diámetro terrestre (12 740 km) desde un sistema de referencia con respecto al cual la Tierra se moviera a 30 km/s?

**Sol:**  $\Delta L = 0,0637 \text{ m}$



Es necesario justificar que los observadores  $O$  y  $O'$  tengan razón cuando afirman estar cada uno en el centro del frente de ondas esférico luminoso.



- ➡ Para los observadores  $O$  y  $O'$ , las coordenadas espacio-temporales del frente de ondas son  $(x, y, z, t)$  y  $(x', y', z', t')$ .
- ➡ Al tratarse de un frente de ondas esférico, se cumple:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \\ (x')^2 + (y')^2 + (z')^2 = (r')^2 \end{cases}$$

- ➡ Teniendo en cuenta que  $c$  es constante, se cumplirá que  $r = ct$  y  $r' = ct'$ .
- ➡ Por lo que las nuevas transformaciones de sistemas inerciales, deben permitir que se cumpla:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \\ (x')^2 + (y')^2 + (z')^2 = (ct')^2 \end{cases}$$



- Si consideramos que el movimiento tiene lugar en la dirección de X, se cumplirá que  $y = y'$  y que  $z = z'$ .
- Al restar las ecuaciones anteriores, se obtiene:

$$x^2 - c^2 t^2 = (x')^2 - c^2 (t')^2$$

- Las soluciones a esta ecuación son:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

Estas ecuaciones se conocen como **transformaciones de Lorentz**

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) \end{cases}$$

- Las transformaciones de Galileo son un caso particular. Si  $v \ll c$ :

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$



### 5.1. Transformación de Lorentz de la velocidad

- ☞ Si un cuerpo se mueve en la dirección de  $X$  con una velocidad  $v_x$  con respecto a un observador  $O$ .
- ☞ ¿Cuál será la velocidad de ese objeto con respecto a  $O'$  si su velocidad relativa es  $v$  en relación con  $O$ ?
- ☞ Para el observador  $O'$ :

$$v_x' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'}$$

- ☞ Teniendo en cuenta las transformaciones de Lorentz:

$$\left. \begin{aligned} \Delta x' &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ \Delta t' &= \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right) \end{aligned} \right\} v_x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}$$

$$v_x' = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}v_x}$$

- ☞ Si  $v \ll c$ , se obtiene la transformación de Galileo:

$$\left\{ \begin{aligned} v_x' &= v_x - v \\ v_y' &= v_y \\ v_z' &= v_z \end{aligned} \right.$$



## ACTIVIDADES

8. Dos cuerpos A y B, se alejan de un observador O en el mismo sentido y con una velocidad de  $0,5 \cdot c$  y de  $0,3 \cdot c$ , respectivamente, en relación con O.
- ¿Cuál es la velocidad de A medida desde B?
  - ¿Concuerta el resultado anterior con el que se obtendría aplicando la transformación galileana?

**Sol:** a)  $v_{AB} = 0,235 c$  ; b) *No concuerda con la transformación galileana*



## 5.2. La velocidad de la luz: una constante en cualquier sistema y un límite infranqueable

- ☞ Supongamos que un cuerpo se desplaza con respecto a  $O$  a la velocidad de la luz,  $v_x = c$ .
- ☞ ¿Con qué velocidad se moverá en relación a  $O'$  si la velocidad de  $O'$  es  $v$  con respecto a  $O$ ?

$$v_x' = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} v_x} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c}} = \frac{c \left(1 - \frac{v}{c}\right)}{1 - \frac{v}{c}} = c$$

### ► La paradoja de $c + c = c$

- ☞ Supongamos que un cuerpo se desplaza con respecto a  $O'$  a la velocidad de la luz,  $c$ .
- ☞ ¿Con qué velocidad se moverá en relación a  $O$  si la velocidad de  $O'$  es  $c$  con respecto a  $O$ ?

$$v_x = \frac{v_x' + v}{1 + \frac{v}{c^2} v_x'} = \frac{c + c}{1 + \frac{c}{c}} = \frac{2c}{2} = c$$

- La velocidad de la luz en el vacío,  $c$  es la misma para todos sistemas de referencia inerciales.
- La velocidad de la luz constituye un límite insalvable.



### 6.1. Masa y momento relativistas

☞ Según la segunda ley de Newton:  $\vec{F} = \frac{\Delta(m\vec{v})}{\Delta t}$

la acción continuada de una fuerza produce una aceleración.

☞ Si imponemos un límite a la velocidad,  $c$ , la acción continuada de la fuerza ya no produce aceleración, lo cual solo puede explicarse si suponemos que **la masa se incrementa con la velocidad**.


☞ La expresión de la masa debe cumplir dos condiciones:

- La **masa relativista** debe alcanzar el valor infinito cuando  $v = c$ .
- La **masa relativista** debe coincidir con la del cuerpo medida en reposo relativo cuando  $v = 0$  ( $m_0$ ).

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$$

☞ Consecuentemente, el momento lineal relativista:

$$\vec{p}_{relativista} = \gamma m_0 \vec{v}$$





## 6.2. Masa y energía relativistas

➡ Teniendo en cuenta que:  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}_{relativista}}{dt}$

Podemos evaluar el trabajo necesario para producir una cierta variación de la energía cinética.

➡ Se demuestra que **la energía cinética de un cuerpo que se mueve con una velocidad relativa  $v$  viene dada por:**

$$\Delta E_c = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$$

➡ El primer término depende de la velocidad, el segundo es la **energía en reposo** de la partícula.

➡ Teniendo en cuenta que  $m = \gamma m_0$ :

$$\Delta E_c = (m - m_0)c^2$$

$$\Delta E_c = \Delta mc^2$$

$$E_{Total} = E_c + E_{reposito} = \gamma m_0 c^2$$

- Cualquier variación de energía se traduce en una variación de la masa, y viceversa.
- **Masa y energía** son dos manifestaciones de la misma cosa o, en otras palabras, la masa es una forma de energía.



Partículas	Símbolos	Energía en reposo (MeV)
Fotón	$\gamma$	0
Electrón (positrón)	$e$ o $e^-$ ( $e^+$ )	0,511 0
Muón	$\mu^\pm$	105,7
Pión	$\pi^0, \pi^\pm$	135; 139,6
Protón	$p$	938,280
Neutrón	$n$	939,573
Deuterón	${}^2H$ o $d$	1 875,628
Tritón	${}^3H$ o $t$	2 808,944
Partícula alfa	${}^4He$ o $\alpha$	3 727,409




## ACTIVIDADES

9. Un muón tiene una energía en reposo de 105,7 MeV y se mueve con una velocidad igual a  $0,7 \cdot c$ . Calcula su energía total, su energía cinética y su momento lineal.

**Sol:**  $E_T = 148,04 \text{ MeV}$ ;  $E_C = 42,34 \text{ MeV}$ ;  $P = 103,63/c \text{ MeV}$




- ☞ La gravedad newtoniana predice que la [órbita](#) de un solo [planeta](#) girando alrededor de una estrella perfectamente esférica debe ser una [elipse](#). La teoría de Einstein predice una órbita más complicada en la cual el planeta se comporta como si estuviera girando en una órbita elíptica, pero esta elipse a su vez está rotando lentamente alrededor de la estrella (ver diagrama). En nuestro sistema solar se puede encontrar este fenómeno de desviación de la órbita newtoniana en [Mercurio](#), en lo que se conoce como [avance del perihelio de Mercurio](#). Este fenómeno se había hecho notar ya en 1859, pero no se dispuso de datos de precisión hasta el uso de radiotelescopios entre 1966 y 1990. El mismo fenómeno se da a menor escala en los demás planetas cercanos al Sol.






- ☞ La teoría de Einstein predice que los rayos de luz no siguen líneas rectas en un campo gravitatorio; se produciría una deflexión de la luz, como se representaba en el gráfico inicial del artículo. La teoría de la Relatividad General predice que la luz de una estrella girará al pasar cerca del Sol, de manera que la posición aparente variará 1.75 segundos de arco. En la teoría de la gravitación newtoniana, al ser el fotón una partícula sin masa, no debería haber *ninguna* deflexión, aunque una aplicación más sutil usando masas infinitesimales según los trabajos de J.G. von Soldner en 1804, podía predecir la mitad de la deflexión einsteniana. Estas predicciones podrían ser confrontadas observando la posición aparente de una estrella durante un [eclipse de Sol](#). En 1919, la expedición británica a Brasil y África del Este para estudiar el eclipse de Sol del 28 de mayo de ese año, dirigida por [Arthur Eddington](#), confirmó la predicción de Einstein. Las medidas de Eddington no eran muy precisas, pero sucesivas observaciones han confirmado los resultados con gran exactitud.





- ➔ Otra predicción de la Teoría de la Relatividad General era el corrimiento gravitacional al rojo. Esta predicción de la teoría de la relatividad general fue la última de las pruebas clásicas en ser confirmada, mediante el [experimento de Pound- Rebka](#) en 1959. Mediante un ingenioso diseño experimental, estos investigadores midieron en el laboratorio Jefferson de la [Universidad de Harvard](#) el corrimiento al rojo cuando una onda de radiación de alta energía iba hacia arriba o hacia abajo en el campo gravitatorio terrestre.





# Información de Contacto

 Rafael Artacho Cañadas

 Granada

 [artacho1955@gmail.com](mailto:artacho1955@gmail.com)